

การเพิ่มผลผลิต

มังคุดเพื่อการส่งออก

ฟื้นฟูสภาพต้น(ทางใบ)



ทางใบ : ฉีดพ่นซานโตซ่า,อีโค-บี 20 cc ต่อน้ำ 20 L และปุ๋ยสูตร 46-0-0 จำนวน 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

ทางดิน : ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 จำนวน 2-5 kg ต่อดัน ขึ้นอยู่กับทรงพุ่ม และปุ๋ยอินทรีย์ 10-20 kg ต่อดัน

ระยะใบเพสลาด (เริ่มสะสมอาหาร)



ทางใบ : ฉีดพ่นเวก้า 2,อีโคแคล 20 cc ต่อน้ำ 20 L จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 10-15 วัน

ทางดิน : 8-24-24 จำนวน 2-5 kg ต่อดัน ขึ้นอยู่กับทรงพุ่ม

ระยะดอก (เก็บเกี่ยว)



ทางใบ : ฉีดพ่นอีโค-บี,อีโคแมก 20 cc ต่อน้ำ 20 L จำนวน 2 ครั้ง ทุกๆ 10-15 วัน ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยว

ทางดิน : 15-15-15 จำนวน 2-5 kg ต่อดัน ขึ้นอยู่กับทรงพุ่ม

หมายเหตุ : ควรผสมยาป้องกันแมลงและยาป้องกันเชื้อราทุกๆครั้งที่ฉีดพ่นทางใบ

