

การเพิ่มผลผลิต ยางพารา

ระยะพักต้น



ทางดิน

-ใช้ยาฆ่าหญ้า, พาราชอยล์ 20-30 cc ต่อน้ำ 20 L ฉีดพ่นโคนต้นทุก 7-15 วัน และใส่ปุ๋ยทางดินสูตร 20-5-15 (หรือสูตรใกล้เคียง) 50 g ผสมกับโดโลไมท์ 50 g โรยที่โคนต้นทุกๆ เดือน
-ใช้ซานโตซ่า, อีโค-บี 20-30 cc ต่อน้ำ 20 L ฉีดพ่นโคนต้นทุก 15-30 วัน

ระยะให้ผลผลิต



ทางดิน

-ใช้ยาฆ่าหญ้า, พาราชอยล์ 20-30 cc ต่อน้ำ 20 L ฉีดพ่นโคนต้นทุก 7-15 วัน และใส่ปุ๋ยทางดินสูตร 20-5-15 (หรือสูตรใกล้เคียง) 50 g ผสมกับโดโลไมท์ 50 g โรยที่โคนต้นทุกๆ เดือน
-ใช้ซานโตซ่า, อีโค-บี 20-30 cc ต่อน้ำ 20 L ฉีดพ่นโคนต้นทุก 15-30 วัน

ถ้าต้องการ ป้องกันปัญหาโรค เชื้อราซึ่งเป็นปัญหาหลักของโรครยาง่ายตายนี้ ให้ป้องกันโดยใช้ ซิงค์เอ็กซ์ 20 cc ต่อน้ำ 20 L ฉีดพ่นให้ทั่วลำต้น และให้สูงที่สุดรวมถึงหน้าดินประมาณ 5 L ต่อต้น

- ปริมาณ 20 L ฉีดได้จำนวน 20-30 ต้น
- เพิ่มปริมาณน้ำยาง
- ลดปัญหายาง่ายตายนี้

