

การเพิ่มผลผลิต ลำไย จัมโบ้



ฟื้นฟูสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยว

กระตุ้นให้ผลิใบอ่อนพร้อมกัน



บีเค 1,อีโค-บี,ซานโตซ่า อย่างละ 20 cc ฉีดพ่นระยะก่อน
ผลิใบอ่อน

ระยะหลังเก็บเกี่ยว : ใส่ปุ๋ยทางดิน 15-15-15 หรือ 25-7-7
ใช้พาราชอยล์ผง 100 g ต่อน้ำ 20 L ฉีดพ่นทางดินหรือให้ใบ
กับระบบน้ำ

ระยะใบเฟสลาด

เพิ่มการสะสมเพื่อใช้ในการออกดอก



เวก้า 2,อีโคแคล อย่างละ 20 cc,ปุ๋ยเกร็ด 0-52-34 ฉีด
พ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10-14 วัน

ใส่ปุ๋ยทางดิน 8-24-24 หรือ 13-13-21 (ควรใส่ปุ๋ยก่อนราด
1 สารสัปดาห์)

ระยะผลิซ่อดอก

ช่วยการผสมเกสร ลดการหลุดร่วง



อีโคแมก,อีโค-แคล,อีโค-บิอย่างละ 20 cc ฉีดพ่น 1-2
ครั้ง ห่างกัน 5-7 วัน

ระยะผลิตซ่อดอกจนถึงก่อนดอกบานล้างสารด้วยพาราชอยล์
ผง 100 g ต่อน้ำ 20 L สดตามที่ราดสาร

ระยะผลอ่อน

ขยายขนาดผล ผลใหญ่สม่ำเสมอ



อีโค-บี,อีโคแคล อย่างละ 20 cc,ปุ๋ยเกร็ด 20-20-20,
30-20-10 ฉีดพ่น 6-7 ครั้ง ห่างกัน 10-14 วัน

ระยะผลอ่อนเท่าเมล็ดถั่วเขียวใส่ปุ๋ยทางดิน 15-15-15 หรือ
25-7-7

ระยะก่อนเก็บเกี่ยว

เนื้อแน่น หวานกรอบ รสชาติดี คุณภาพเยี่ยม



อีโคแคล,เวก้า 2 อย่างละ 20 cc ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน
10-14 วัน

ระยะก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน (เมล็ดเริ่มดำ) ใส่ปุ๋ยทางดิน
13-13-21 หรือ 8-24-24

