

การเพิ่มผลผลิต

สตรอเบอรี่



เตรียมแปลงปลูกใช้ฟาราซอยล์ผง 4 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นลงแปลงที่จะปลูก ช่วยปรับสภาพดิน เพิ่มธาตุอาหารในดิน



- ครั้งที่ 1 : ฉีดพ่นฟาราซอยล์ครึ่งช้อน ใช้ซานโตซ่า,อีโค-บี อย่างละ 20 cc ต่อน้ำ 20 L ฉีดพ่น หลังแตกยอด 7 วัน
- ครั้งที่ 2 : เป็นต้นไป ใช้ฟาราซอยล์ 1 ช้อน ต่อน้ำ 20 L ใช้ ซานโตซ่า,อีโค-บี,อีโคแคล อย่างละ 20 cc ต่อน้ำ 20 L



- ครั้งที่ 2 : อายุ 15 วัน
- ครั้งที่ 3 : อายุ 20 วัน
- ครั้งที่ 4 : อายุ 30 วัน



โรคที่สำคัญ ได้แก่ โรคใบจุด,โรคใบไหม้,โรคต้นเน่า,โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส โรคเหล่านี้สามารถป้องกันได้โดยใช้ต้นพันธุ์ที่ปลอดโรคและหมั่นดูแลตัดแต่งใบที่เป็นโรคและใบแก่ออกเสมอ

* จัดการแปลงให้โปร่งโล่ง มีการถ่ายเทอากาศดีไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค

